

Mỗi năm thế giới có đến 900 000 trường hợp chết do t. t.

T&#225;c Gi&#7843;: Lê Ph&#225;c

Th&#7913; B&#7843;y, 23 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2012 17:46

---

Đ. là n&#225;c có số người t. t. cao nhất thế giới với 187 000 trường hợp vào năm 2010



Một chuyên đề thông tin để phòng t. t. t. i Anh (DR)

Hôm qua 22/06/2012, tạp chí y học Lancet của Anh đăng tải một kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi năm có đến 900 000 trường hợp chết do t. t. .

T. báo khuyến nghị, để phòng ngừa t. t. , nên hạn chế việc tiếp cận với những cách t. t. có nguy cơ gây t. vong cao nhất.

Nghiên cứu này do giáo sư Paul Yip thuộc Trung tâm nghiên cứu về sốt ở trẻ em và Trẻ em ở Trung Quốc và Hồng Kông. Theo nghiên cứu, nguy cơ cách tiếp cận nguy hiểm nhất và phổ biến nhất đó là : dùng thuốc M, thuốc trị sâu ở Châu Á và Châu Mỹ La Tinh.

Tạp chí Lancet cũng đăng một nghiên cứu khác cho thấy, ở Việt Nam là nước có số người tiếp cận cao nhất thế giới với 187 000 trẻ em chết vào năm 2010. Cách tiếp cận chi phí tiếp cận cao nhất ở nước này là dùng thuốc trị sâu với 50% các trường hợp. Theo nghiên cứu, tại Việt Nam, dân nông thôn tiếp cận cao hơn dân thành thị, phụ nữ tiếp cận nhiều hơn đàn ông.

Ở các nước phát triển, tiếp cận nam-nữ tiếp cận là 1-3, trong khi tại Việt Nam là 1,5-1, tại Trung Quốc là 1-1. Như vậy, phụ nữ Châu Á tiếp cận nhiều hơn phụ nữ phương Tây, và phụ nữ Trung Quốc có chi phí tiếp cận tiếp cận cao nhất. Liên quan đến thanh thiếu niên tuổi dưới 25, mỗi năm có đến 164 000 trẻ em chết tiếp cận.

Biện pháp phòng ngừa mà giới nghiên cứu khuyến nghị đó là hạn chế việc tiếp cận những cách tiếp cận thông dụng và nguy hiểm nhất. Như việc cấm bán thuốc giảm đau co-proxamol tại Scotland, một loại thuốc giảm đau gây tử vong nếu uống quá liều, hay việc hạn chế nhập khẩu thuốc trị sâu ở Sri Lanka.

Nhiều quốc gia đã có những chương trình phòng ngừa tiếp cận bằng cách xác định các nhóm người hay cá nhân có nguy cơ tiếp cận để theo dõi. Biện pháp này tuy nhiên không có một nghiên cứu nước nào có thu nhập thấp và trung bình, nhưng nước chiếm đến 84% các trường hợp trên thế giới.